

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN EULAR/ACR 2019

Aringer M et al. 2019 European League Against Rheumatism / American College of Rheumatology classification criteria for systemic lupus erythematosus. *Ann Rheum Dis.* 2019; 78:1151-59 y *Arthritis Rheumatol.* 2019; 71:1400-12.

1.- **Criterio de entrada:** ANA+ a título $\geq 1/80$ realizado en células HEp2 o equivalente.

- Ausente → no clasificable como LES.
- Presente → aplicar los criterios adicionales.

Crterios en categorías clínicas	Puntos
<i>Constitucional</i>	
Fiebre	2
<i>Hematológicos</i>	
Leucopenia	3
Trombocitopenia	4
Hemólisis autoinmune	4
<i>Neuropsiquiátricos</i>	
Delirio	2
Psicosis	3
Convulsiones	5
<i>Mucocutáneos</i>	
Alopecia no cicatricial	2
Úlceras orales	2
Lupus cutáneo subagudo o discoide	4
Lupus cutáneo agudo	6
<i>Serosos</i>	
Derrame pleural o pericárdico	5
Pericarditis aguda	6
<i>Musculoesqueléticos</i>	
Afectación articular*	6
<i>Renales</i>	
Proteinuria > 500 mg/24 h	4
Biopsia renal con nefritis lúpica clase II o V	8
Biopsia renal con nefritis lúpica clase III o IV	10
Crterios en categorías inmunológicas	Puntos
<i>Anticuerpos antifosfolípido</i>	
Anticuerpos anti-cardiolipina o Anticuerpos anti-β2GP1 o Anticoagulante lúpico	2
<i>Complemento</i>	
C3 bajo o C4 bajo	3
C3 bajo y C4 bajo	4
<i>Anticuerpos específicos de LES</i>	
Anticuerpos anti-dsDNA o Anticuerpos anti-Smith	6

2.- **Criterios adicionales:**

- No contabilizar como criterio si hay otra explicación más probable que LES
- Es suficiente con cumplir un criterio en una ocasión
- Los criterios no necesitan cumplirse simultáneamente
- En cada categoría solo se cuenta el criterio con la puntuación más alta
- **Para cumplir los criterios de clasificación de LES se requiere ≥ 1 criterio clínico y ≥ 10 puntos**

* Sinovitis (inflamación o derrame) de ≥ 2 articulaciones o artralgias en ≥ 2 articulaciones con rigidez matutina > 30 min.